



ハクサイ編



病害虫注意報 2024年9月号

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

チョウ目害虫・アブラムシ類の防除

チョウ目害虫



多発条件

- ▶20~30℃、多湿条件
- ▶隣接圃場など外部からの侵入

ハスモンヨトウ



多発条件

- ▶外部からの飛来・侵入
- ▶25~30℃
- ▶乾燥

シロイチモジヨトウ

アブラムシ類



多発条件

- ▶20~25℃
- ▶乾燥
- ▶隣接圃場など外部からの侵入

Point! 高温少雨が続き、多発します。台風の被害によって病害リスクも高まるため、計画的な防除を心掛けましょう！

今月のおすすめ殺虫剤ローテーション

対象害虫によって使用の希釈倍数が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

順序	RAC	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数
①	22A	シロイチモジヨトウ・コガ ハマダラメノメイガ・ヨトウムシ 等	トルネードエースDF	2,000倍 (コガ・アムシ1,000~2,000倍)	7日前	2回
②	4A	アブラムシ類・キジノミムシ 等	アルバリン顆粒水溶剤	2,000倍 (アブラムシ類2,000~3,000倍)	3日前	2回
	30	ハスモンヨトウ・シロイチモジヨトウ オタバコガ・アムシ・コガ 等	グレースシア乳剤	2,000~3,000倍	7日前	2回
③	23	アブラムシ類・コガ	モベントフロアブル	4,000倍	7日前	3回
	5	ハスモンヨトウ・コガ オタバコガ・アムシ 等	ディアナSC	2,500~5,000倍	前日	2回
④	28	ハスモンヨトウ・シロイチモジヨトウ オタバコガ・アムシ・コガ 等	兼商ヨーバルフロアブル	2,500~5,000倍	前日	3回

今月のおすすめ殺菌剤

対象害虫によって使用の希釈倍数が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

RAC	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数
U18	軟腐病・黒斑細菌病 予	バリダシン液剤5	500倍	3日前	3回
31	軟腐病・黒斑細菌病 予	スターナ水和剤	1,000倍	7日前	3回
M01	軟腐病、ナメクジ類 等 予	兼商クプロシールド※	1,000~1,500倍 (ナメクジ類:1,000倍)	—	—
2	白斑病・黒斑病・菌核病 予	ロブラール水和剤	1,000~1,500倍 (菌核病1000倍)	14日前	3回

※野菜類登録/結球期以降使用不可

フルボデイ

腐植酸(フルボ酸・フミン酸)→土壌の団粒化
海藻抽出成分配合→根の伸長促進

定植ストレスを軽減・活着促進!

葉菜類使用例 500ml/セルトレイ 灌注 定植前



リダバイタル

テンサイ糖蜜含有 植物性アミノ酸配合

低温障害を軽減

光合成促進

葉菜類登録 葉面散布 500~1,000倍

