



レタス編



病害虫注意報 2024年9月号

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

☆育苗～定植時のおすすめ粒剤・灌注剤

非結球レタス、リーフレタスもラベルに記載されている詳細な登録内容確認の上、ご使用下さい。

RACコード	適用病害虫	薬剤名	使用量・希釈倍数・方法	時期	回数	非結球レタス登録
P02	斑点細菌病・腐敗病	オリゼメート粒剤	6～9kg/10a 土壌混和	定植時	1回	○
28	アブラムシ類・オタバコガ ハゲリバエ類・ヨウムシ ハシモンヨトウ	兼商ヨールフロアブル	200倍 灌注	育苗期後半～ 定植当日	1回	○
28, 4A	アブラムシ類	ミネクトデュオ粒剤	6g/培土L 育苗培土混和	は種前	1回	×
	ヒメフタテンヨコバイ		セル成型育苗トレイ1箱 またはハ°-ハ°-ポット1冊 あたり40g 散布	育苗期後半 は種覆土後～ 育苗期後半		○
	アブラムシ類・ハゲリバエ類 オタバコガ・ネリムシ類					リーフ○
			1g/株 株元散布	定植時		×

ミネクトデュオ粒剤を使用した場合、下記の薬剤は苗場での使用ができません!!

- ・ベリマークSC
- ・ジュリボフロアブル
- ・プリロツソ粒剤オメガ
- ・アクタラ顆粒水溶剤
- ・アクタラ粒剤5
- ・ヘネビアOD
- ・アベイル粒剤



★育苗期の病害虫対策

非結球レタス、リーフレタスもラベルに記載されている詳細な登録内容確認の上、ご使用下さい。

RACコード	適用病害虫	薬剤名	希釈倍数	時期	回数	非結球レタス登録
M05	すそ枯病・べと病 灰色かび病	ダコニール1000	1,000倍(散布)	14日前	3回	○ (灰色かび病× 時期:21日前)
U18	すそ枯病・軟腐病 腐敗病	バリダシン液剤5	800倍	前日	3回	○ (時期:3日前)
15	オタバコガ	マッチ乳剤	2,000倍	3日前	3回	○
6	オタバコガ・ハシモンヨトウ シヨイモジヨトウ	アニキ乳剤	1,000～2,000倍	3日前	3回	○ (シヨイモジヨトウ×)
23	アブラムシ類・アザミウマ類	モベントフロアブル	2,000～4,000倍 (アザミウマ:2,000倍)	7日前	3回	○ (時期:14日前)
14	アブラムシ類・ナメクジ類 ハゲリバエ類	パダンSG水溶剤	1,500倍	14日前	3回	○ (回数:2回)

フルボディ

腐植酸(フルボ酸・フミン酸)→土壌の団粒化
海藻抽出成分配合→根の伸長促進



定植ストレスを軽減・活着促進!

野菜類使用例 500ml/セルトレイ 灌注 定植前



クロスバリュー

2種類の微生物の力で

- 環境ストレスへの耐性強化
- 収量や品質の安定化

野菜類使用例

500～1,000倍、50～100ml/株
定植時～定植後、株元灌注

