




# ハクサイ編

## 病害虫注意報 2024年10月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

白斑病・べと病・アブラムシ類・チョウ目害虫が多発しやすい時期になります。  
予防的なローテーション散布を行い、発生前からしっかり防除していきましょう。



白斑病

### 症状

- ▶ 葉の表面に灰褐色の斑点
- ▶ 斑点は拡大し不規則な形となり灰白色や白色になる

### 多発条件

- ▶ 比較的低温
- ▶ 多湿



べと病

### 症状

- ▶ 下葉に淡黄色不正形の病斑を形成する。
- ▶ 上葉や莖にも発生する。

### 多発条件

- ▶ 18℃前後
- ▶ 多湿

## 今月のおすすめローテーション

対象害虫によって使用の希釈倍数が異なる場合があります。  
ラベルの確認をしてから使用してください。

順序	RAC	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数
①	4A	アブラムシ類・コガ・アムシ 等	モスピラン顆粒水溶剤	2,000~4,000倍 (コガ・アムシは1,000~2,000倍)	14日前	3回
	30	コガ・ハモンヨウ オタバコガ・シイモジヨウ等	ブロフレアSC	2,000~4,000倍	前日	3回
②	9D	アブラムシ類	セフィーナDC	2,000~4,000倍	前日	2回
	6	コガ・ヨウムシ・アムシ	アフーム乳剤	1,000~2,000倍	7日前	3回
③	13	ヨウムシ・アムシ・コガ 等	コテツフロアブル	2,000倍	前日	2回
	4C	アブラムシ類	トランスフォームフロアブル	2,000倍	3日前	3回
④	9B	アブラムシ類	コルト顆粒水和剤	4,000倍	3日前	3回

## 今月のおすすめ殺菌剤

対象害虫によって使用の希釈倍数が異なる場合があります。  
ラベルの確認をしてから使用してください。

RAC	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数
11,7	白斑病・べと病・白さび病 尻腐病・菌核病 等	シグナムWDG	1,500~2,000倍 (菌核病、炭疽病、尻腐病 1,500倍)	7日前	3回
40,49	べと病	オロンディスウルトラSC	2,000倍	7日前	2回
4,M05	べと病、ピシウム腐敗病 白さび病	フォリオゴールド※	800~1,000倍 (ピシウム腐敗病、白さび病 1,000倍)	7日前	2回
7	白斑病・黒斑病 菌核病・尻腐病	アフエットフロアブル	2,000倍	前日	3回

※フォリオゴールドはダコニール1000と合わせて2回まで

## カテキンパワーUP

「カテキンパワー」がリニューアル!!

成分などの見直しで、  
抗菌力・使いやすさ・コスパがUP!!

成分：カテキン類 内容量：1リットル  
野菜類使用例 500倍 葉面散布 樹勢回復



チップバーンなどの予防に!

## ファイトカル

1,000倍 10~14日おきに葉面散布

▶ 優れた展着性・浸透性で、  
葉先や果実の先までカルシウムを!!

▶ 有機酸とトレハロースによるWキレート  
カルシウム含有

アミスター、無機銅、ホルモン剤  
液肥類との混用は出来ません



肥料登録  
第83188号