



カリフラワー編

病害虫注意報 2024年11月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

軟腐病・黒すす病 対策

収穫が近くなったカリフラワーは軟腐病、黒すす病に注意してください。
軟腐病と黒すす病は基本的に有効な薬剤が異なります。
ローテーションによる薬剤防除でそれぞれの病害を予防しましょう。



軟腐病

症状

- ▶ 花蕾が淡褐色～褐色に腐敗する
- ▶ 悪臭を放つ

多発条件

- ▶ 激しい降雨
- ▶ 害虫の食害などが多い圃場



黒すす病

写真はロマネスコ

症状

- ▶ 葉や花蕾に発生
- ▶ 小黑点の症状が広がる

多発条件

- ▶ 保菌種子による伝染
- ▶ 前作発病した圃場
- ▶ 窒素過多
- ▶ 葉面の濡れ

病害おすすめ薬剤

対象病害虫によって使用の希釈倍数が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

| RAC | 対象病害 | 薬剤名 | 希釈倍数 | 使用時期 | 回数 |
|------|--------------|-----------------|--------------|------|----|
| 7 | 黒すす病・菌核病・根朽病 | 予 アフェットフロアブル※1 | 2,000倍 | 前日 | 3回 |
| 7,11 | 黒すす病・菌核病 | 予・治 シグナムWDG※1,2 | 1,500倍 | 7日前 | 2回 |
| 31 | 軟腐病 | 予 スターナ水和剤 | 2,000倍 | 14日前 | 2回 |
| M01 | 花蕾腐敗病・黒斑細菌病 | 予 兼商クプロシールド※1,3 | 1,000～2,000倍 | — | — |

チョウ目にお困りの場合は・・・

| RAC | 対象害虫 | 薬剤名 | 希釈倍数 | 使用時期 | 回数 |
|-----|---------------------------|-----------|--------------|------|----|
| 5 | コガ・ハスエントウ・ヨウムシ・アムシ等 | ディアナSC | 2,500～5,000倍 | 前日 | 2回 |
| 6 | コガ・ハスエントウ | アニキ乳剤 | 1,000～2,000倍 | 前日 | 3回 |
| | コガ・材外コガ・アムシ・アザミワタ類 | アフーム乳剤 | 1,000～2,000倍 | 3日前 | 3回 |
| 30 | コガ・ハスエントウ シイモシヨウ・材外コガ等 | ブロフレアSC※1 | 2,000～4,000倍 | 前日 | 3回 |
| | コガ・ハスエントウ・アムシ・アザミワタ類 等 | グレーシア乳剤※1 | 2,000～3,000倍 | 7日前 | 2回 |

※1：はなやさい類登録 ※2：シグナムWDGはカンタスドライブフロアブルと合わせて2回 ※3：花蕾形成期以降は散布不可(薬害)

カテキンパワーUP↑

「カテキンパワー」がパワーアップしてリニューアル!!

成分などの見直しで、**抗菌力・使いやすさ・コスパがUP!!**

成分：カテキン類 野菜類使用例：500倍 1～2週間ごとに葉面散布
内容量：1リットル 肥効：樹勢回復、活着促進、生育増進

Point!

茶抽出物の選抜
で抗菌力が向上

水に溶けやすくなり、
散布しやすい

原材料などの見直し
で値下げを実現

