



レタス編

病害虫注意報 2024年11月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

すそ枯病・斑点細菌病 対策

すそ枯病

病原菌 : *Rhizoctonia solani* (糸状菌)

多発条件 : 気温20~25℃で多雨

土壌の過湿

注意点・予防のポイント :

- ▶ 中耕時に土が多く付着すると多発しやすい
- ▶ 土壌からの伝染が多いため、マルチなどで土の跳ね上がりを防ぐ
- ▶ 結球期以降の継続的な農薬散布がオススメ

斑点細菌病

病原菌 : *Xanthomonas campestris* (細菌)

多発条件 : 強い風や長雨に晒される

多湿

注意点・予防のポイント :

- ▶ 土の跳ね上げ防止を目的に全面マルチ栽培を行う
- ▶ トンネル栽培では換気に注意し、結露を減らす
- ▶ 被害株は廃棄し、多発圃場では連作を避ける



今月のおすすめローテーション

対象病害によって希釈倍数が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

時期	RAC	対象病害	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	非結球レタス登録
11月①	M01	腐敗病 予	兼商クプロシールド <small>※レタス類登録</small>	1,000倍	-	-	○
11月②	2	すそ枯病・菌核病 予	ロブラール水和剤	1,000倍 (灰色かび病:1,000~1,500倍)	14日前	3回	○ (21日前)
11月③	31	軟腐病・腐敗病 等 予	スターナ水和剤	2,000倍	7日前	2回	○ (14日前) <small>軟腐病・腐敗病のみ</small>
11月④	7,11	すそ枯病・灰色かび病 菌核病 等 予・治	シグナムWDG	1,500倍 (べと病:1,500~2,000倍)	7日前	2回	○ (14日前)

害虫防除におすすめ!

対象害虫によって希釈倍数が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

RAC	対象害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	非結球レタス登録
6	オタバコガ・ハマヨトウ 等	アニキ乳剤	1,000~2,000倍	3日前	3回	○ (前日)
9B	アブラムシ類	コルト顆粒水和剤	3,000~4,000倍	前日	3回	○ (7日前)
30	オタバコガ・ハマヨトウ ヨイモトヨトウ 等	ブロフレアSC <small>※レタス類登録</small>	2,000~4,000倍	前日	3回	○

カテキンパワーUP

成分などの見直しで、「カテキンパワー」がリニューアル!!

抗菌力・使いやすさ・コストがUP!!

成分: カテキン類 内容量: 1リットル
野菜類使用例 500倍 葉面散布 樹勢回復



白酢

POINT

- ◆ 発根を促進し 根張りが向上
- ◆ 固定されたリン酸の吸収を促進
- ◆ 一時的なpHの抑制

灌注時: 100~300倍
散布時: 300~1,000倍 ※強酸性のため100倍より濃く希釈しないように注意

