



# イチゴ編

病害虫注意報 2024年11月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

天敵導入後1～2週間は、定着させるために薬剤散布や葉かきは控えましょう！



## スパイカルプラスUM新発売！

パックを枝などに吊るすだけ！放飼作業を省力化した  
スパイカルプラスがUMとなってさらに使いやすくなりました！

### 従来品と比較したスパイカルプラスUMの特徴

- ・生分解性樹脂袋が採用されたパック製剤
- ・カブリダニの増殖・放出量が従来品より増加
- ・遮光性・耐水性・保湿性に優れた素材の採用
- ・露地栽培でも雨の影響を軽減
- ・フック部分が厚く丈夫に（防水加工の改善）

## 天敵導入後 おすすめローテーション

対象病害虫によって希釈倍数が異なる場合があります。  
ラベルの確認をしてから使用してください。

時期	RAC	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数			
							ミツバチ	マルハナバチ	ミヤコ	クワ
11月 ③	9,U13	灰色かび病 うどんこ病	ショウチノスケフロアブル	2,000倍	前日	2回	0日		0日	
	25A	ハダニ類 シラメンホコリダニ	スターマイトフロアブル 卵(ハダニ類)にも効果あり	2,000倍	前日	2回	1日		0日	
	10A	ハダニ類 (ハダニ類の多発時は追加)	ニツソラン水和剤 卵にも効果あり	2,000～ 3,000倍	前日	2回	0日	1日	0日	
12月 ②	2	灰色かび病	ロブラール500アクア	1,000～ 1,500倍	前日	4回	1日		0日	
	20D	ハダニ類	マイトコーネフロアブル 卵にも効果あり	1,000倍	前日	2回	1日		0日	
12月 ②	M07	うどんこ病・黒斑病 炭疽病 灰色かび病	ベルコートフロアブル	2,000倍 (うどんこ病 2,000～ 4,000倍)	前日 (生育期)	5回	0日		0日	
	25B	ハダニ類	ダニコングフロアブル 卵にも効果あり	3,000倍	前日	1回	1日		0日	

★ いずれの薬剤も、高温時・多湿時の散布は控えその日のうちにきちんと乾かしましょう！

# トリオバイタル

餌入り製剤2種の  
同時訪飼で  
ハダニをきっちり防除！

スパイデックスバイタル：  
餌入り製剤でより安定した防除効果を発揮

