



イチゴ編

病害虫注意報 2025年1月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

春先の病害虫蔓延を防ぐために 定期的な防除を心がけましょう！



収穫中 おすすめローテーション



対象病害虫によって希釈倍数が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

| 時期 | RAC | 対象病害虫 | 薬剤名 | 希釈倍数 | 使用時期 | 回数 | 影響日数 | | | |
|-------------|------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------|----|------|------|----|---|
| | | | | | | | ミツバチ | マルハナ | ミコ | 刊 |
| 1月 ③ | 11 | 炭疽病 灰色かび病 | 予・治 ファンタジスタ 顆粒水和剤 | 2,000~3,000倍 (炭疽病: 2,000倍) | 前日 | 3回 | 1日 | | 0日 | |
| | - | うどんこ病・コナジラミ類 ハダニ類・アブラムシ類 | フーモン ※野菜類登録 | 1,000倍 | 前日 | - | 0日 | | 1日 | |
| 天敵導入 | | | | | | | | | | |
| 2月 ① | 7,11 | うどんこ病・炭疽病 灰色かび病 | 予・治 シグナムWDG | 2,000倍 灰色かび病: 1,500~2,000倍 | 前日 | 2回 | 0日 | - | 0日 | - |
| | 34 | アザミマ類 | ファインセーブ フロアブル | 1,000~2,000倍 | 前日 | 3回 | 1日 | | 0日 | |
| 2月 ② | 9 | うどんこ病 灰色かび病 | 予・治 フルピカフロアブル | 2,000~3,000倍 | 前日 | 3回 | 0日 | | 0日 | |
| | 15 | アザミマ類 ハスモンヨトウ | マッチ乳剤 | 1,000~2,000倍 ハスモンヨトウ: 3,000倍 | 前日 | 4回 | 1日 | 0日 | 0日 | |

根張り改善に!

ファイトメット

100~150g/10aまたは
2,000~3,000倍灌水

根張りが悪くなる冬期・収穫期
新しい根を出すチカラを!!

▶毛細根の充実!

▶リン酸・ミネラル分の吸収UP!



肥料登録
輸第84050号

テップバーン対策に!

ファイトカル

1,000倍 葉面散布

優れた展着性と浸透性!
グリシンバタイン配合!
軟弱果対策にも
おすすめです!

アミスター、無機銅、ホルモン剤
液肥類との混用は出来ません



肥料登録
生第83188号

おすすめ資材

酸欠を防ぎ根の動きを促す!

ピュア酸素

根張り促進や成り疲れ
防止に灌水処理が
お勧め!

10kg/10a

7~14日おき灌水処理

