



キュウリ編

天敵非導入版
病害虫注意報 2025年2月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

春にかけてアザミウマ類の発生が多くなる時期です。
発生を確認したら密度の低いうちに防除しましょう。

防除のポイント

- ・青色粘着板、防虫ネットの設置
- ・ハウス周りの除草
- ・アザミウマ類が寄生しやすい新芽を確認し、密度が低いうちから防除。



今月のおすすめローテーション

天敵導入されない方向けです！
導入される方は別紙をご確認ください。

時期	RAC	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数 スルスルー
2月①	2	つる枯病・菌核病 等 予	ロブルール水和剤	1,000倍	前日	4回	7日
	13	ミカンイロアザミウマ ミナミイロアザミウマ・ハダニ類 等	コテツフロアブル	2,000倍	前日	3回	14日
2月②	11, M05	べと病・うどんこ病 灰色かび病・炭疽病 等 予・治	アミスターオプティフロアブル	1,000倍	前日	4回	-
	4C	アブラムシ類・コナジラミ類	トランスフォームフロアブル	2,000倍 コナジラミ類：1,000～2,000倍	前日	2回	0日
2月③	17	菌核病・灰色かび病 予・治	ピクシオDF	2,000倍	前日	4回	-
	5	アザミウマ類・ハダニ類 ウリメイト・コナジラミ類	ディアナSC	2,500～5,000倍 コナジラミ類：2,500倍	前日	2回	14日↑
2月④	7	つる枯病・うどんこ病 褐斑病 予・治	ケンジャフロアブル	1,500倍	前日	4回	0日
	6	コナジラミ類・アザミウマ類 ハダニ類	アグリメック	500～1,000倍	前日	2回	7日

対象病害虫によって希釈倍数が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

※（アミスター、ダコニール単剤では0日）

ガイア蘇生

成り疲れ対策！

10～14日に1回
1kg/10a灌注

- ・静菌・静虫作用
- ・側根誘導

毛細根の発達により
成り疲れを予防



規格：20kg

おすすめ資材

ピュア酸素

- ☆ 土壌に酸素を供給し、根の活動を活発に！
- ☆ 肥料・葉面散布剤の吸収を良くします！

混入機：10kg/10a
動噴：100倍

