



# ナス編

## 病害虫注意報 2025年2月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。



ミナミキイロアザミウマ・コナジラミ類等の発生が多くなりやすい時期です。発生確認前から予防的に防除しましょう。



アザミウマ吸汁痕



アザミウマ類成虫



外コナジラミ成虫



ハシコナジラミ成虫

## おすすめローテーション

対象病害虫によって希釈倍数が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

時期	RAC	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数		
							ミツバチ	マルハナバチ	スルスキー
2月①	7	灰色かび病・すすかび病 うどんこ病 等	<b>予</b> アフェットフロアブル	2,000倍	前日	3回	0日	1日	0日
	6	アザミウマ類・コナジラミ類 ハダニ類	アグリメック	500~1,000倍	前日	3回	14日	7日	7日
2月②	7, 11	灰色かび病・すすかび病 うどんこ病 等	<b>予・治</b> シグナムWDG	1,500倍 (すすかび病 1,500~2,000倍)	前日	3回	0日	-	0日
	5	アザミウマ類・コナジラミ類 ハダニ等	ディアナSC	2,500~5,000倍 (コナジラミ類2,500倍)	前日	2回	3日	1日	<b>14日↑</b>
2月③	19	うどんこ病 灰色かび病 等	<b>予・治</b> ポリオキシムAL水溶剤	5,000倍	前日	3回	0日		14日
	15	アザミウマ類 材外コナジラミ	マッチ乳剤	2,000倍	前日	4回	1日	0日	0日
2月④	11	うどんこ病 すすかび病 等	<b>予・治</b> ファンタジスタ 顆粒水和剤	2,000倍	前日	3回	1日		0日
	34	アザミウマ類 外コナジラミ類 (シルバーリーフコナジラミを含む)	ファインセーブ フロアブル	1,000~2,000倍 (外コナジラミ類1,000倍)	前日	3回	1日		0日

## 厳寒期対策おすすめ資材

植物本来の力を活性化！ **光合成能力UP!**

**ファイトオーツ & ファイトマジック**

1,000倍 葉面散布

植物本来の力を活性化☆

- ▶糖の転流促進
- ▶毛細根の充実
- ▶抵抗性誘導物質の向上

アルカリ性農薬、石灰硫黄合剤、アゾキシストロビン剤(アミスター)、クレソキシムメチル剤(ストロビー)、無機銅剤、ホルモン剤、液肥類などの混用はさけてください

1,000倍 葉面散布

キレートマグネシウム  
+各種微量元素

- ★葉にテリ・ツヤ・厚みUP!
- ★日照不良時の代謝の向上!



肥料登録 生第83241号



肥料登録 生第87201号

## 置型しなもん

温風加熱器の吹出口付近に置くだけ!



すすかび病30ml/10a/日