



イチゴ編

病害虫注意報 2025年3月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

ハダニ防除のポイント

ハダニ類はほとんどの場合、卵から成虫のステージが混在します。
化学農薬や気門封鎖剤を組み合わせた様々な作用機構の薬剤で防除しましょう。



- 最適温度は20～30℃。
- 乾燥条件で多発する。
- 隣接株への移動速度は遅く、初期はスポット発生が多い。

収穫中 おすすめローテーション

対象病害虫によって希釈倍数が異なる場合があります。
ラベルの確認をしてから使用してください。

時期	RAC	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数			
							ミツバチ	マルハナミチ	ミチ	刊
3月 ③	7	灰色かび病 うどんこ病	予 ネクスターフロアブル	1,000倍	前日	3回	1日		0日	
	-	ハダニ類・コナジラミ類 うどんこ病・アブラムシ類	フーモン ※野菜類登録	1,000倍	前日	-	0日		1日	
4月 ①	U06, 3	うどんこ病	予・治 パンチョTF顆粒水和剤	2,000倍	前日	2回	0日		0日	
	33	ハダニ類	ダニオーテフロアブル 卵にも効果あり	2,000倍	前日	2回	0日		0日	
4月 ②	34	アザミウマ類	ファインセーブフロアブル	1,000～ 2,000倍	前日	3回	1日		0日	
	9B	アブラムシ類 コナジラミ類	チェス顆粒水和剤	5,000倍	前日	3回	0日		0日	

萎れ・葉焼け対策に

ファイトカル

1,000倍 7～10日おきに葉面散布

- ▶ 優れた展着性・浸透性で、葉先や果実の先までカルシウムを!!
- ▶ 有機酸とトレハロースによるWキレートカルシウム含有



肥料登録
生第83188号

アミスター、無機銅、ホルモン剤
液肥類等との混用は出来ません

ミツバチくん応援資材

カモンビービー

こんな時におすすめ!

- 低温や高温でハチが箱から出てこない
- 花が少なくハチが寄り付かない
- ハチが思う様に飛ばない
- 毎年着果不良や奇形果が多い

10パック入り(10a標準使用量:6～12パック)

※使用方法など詳細は
お問い合わせください!!

