



トマト編

病害虫注意報 2025年3月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

コナジラミ類・ハモグリバエ類 対策

天窓を開くことも多くなる2月後半からコナジラミ類が増加します。
ハモグリバエ類も増えてきますので発生初期からしっかり防除を行っていきましょう！

おすすめ防除ローテーション

対象病害虫によって希釈倍数が異なる場合があります。
ラベルの確認をしてから使用してください。

時期	RAC	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数 マルハナバチ
3月①	15	コナジラミ類・ハモグリバエ類 トマトヒゲナシ等	マッチ乳剤	2,000倍 (ハモグリバエ類1,000倍)	前日	4回	0日
	-	うどんこ病・ハダニ類 コナジラミ類・アブラムシ類	フーモン ※野菜類登録	1,000倍	前日	-	0日
3月②	6	コナジラミ類・ハモグリバエ類 トマトヒゲナシ・オタバコカ トマトバガ	アフーム乳剤	2,000倍	前日	5回	2日
3月③	5	コナジラミ類・ハモグリバエ類 トマトバガ・オタバコカ等	ディアナSC	2,500~5,000倍 (コナジラミ類2,500倍)	前日	2回	1日
3月④	21A, 16	コナジラミ類・トマトヒゲナシ	アプロードエース フロアブル	1,000~2,000倍 (トマトヒゲナシ1,000倍)	前日	3回	-
	-	コナジラミ類・ハダニ類 アブラムシ類・うどんこ病	フーモン ※野菜類登録	1,000倍	前日	-	0日

灰色かび病・うどんこ病対策オススメ剤


RAC	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数 マルハナバチ	登録有無	
						灰色かび病	うどんこ病
7	予 ケンジャフロアブル	1,500倍	前日	3回	1日	○	○
M07	予 ベルクートフロアブル	2,000~4,000倍	前日	3回	0日	○	○
9,U13	予・治 ショウチノスケフロアブル	2,000倍	前日	2回	0日	○	○
M10	予 パルミノ	2,000倍	前日	5回	1日(加)		○
17	予・治 ピクシオDF	2,000倍	前日	4回	1日	○	
52	予 ミギワ10フロアブル	1,000倍	前日	3回	1日	○	

萎れ・葉焼け予防

ファイトカル 1,000倍 葉面散布

優れた展着性と浸透性！
グリシンタイプの新配合！
尻腐れ果対策にもおすすめです！

アミスター、無機銅、ホルモン剤
液肥類との混用は出来ません



肥料登録
生第83188号

すずみどりXL

なぜ暑くないのに
すずみどり？

ハウス内に吊るすだけ
10~20本/10a

※手で折り曲げてから吊るしてください



二酸化炭素発生機を導入されている方は
高温期以外の使用もおすすめ！

A. 香り成分で気孔を強制的に開かせる
→二酸化炭素の吸収をサポート！

光合成を促進させます！

効果の持続は約3か月

